

# KAKO V LATEXU PIŠEMO MATEMATIČNE SIMBOLE, ENAČBE IN DIAGRAME

ANDREJ BAUER AND BATMAN

Povzetek. V članku predstavimo, kako v LATEXu z uporabo paketov AMS stavimo matematiko.

## 1. OSNOVNA MATEMATIKA

Pravilno: za vsak realen pozitiven  $x$  obstaja  $k \in \mathbb{N}$ , da je  $0 < 1/k < x$ .

Narobe: za vsak realen pozitiven  $x$  obstaja  $k \in \mathbb{N}$ , da je  $0 < 1/k < x$ .

Narobe: za vsak realen  $x$  velja  $x^2 - 2x + 1 = 0$ .

Pravilno: za vsak realen  $x$  velja  $x^2 - 2x + 1 = 0$ .

Pravilno: za nenegativna števila  $x_1, \dots, x_n$  velja

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}},$$

kjer enakost velja natanko tedaj, ko  $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ .

Narobe: za nenegativna števila  $x_1, \dots, x_n$  velja

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

kjer enakost velja natanko tedaj, ko  $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ .

Za spiske raznih operatorjev in simbolov, ki jih lahko stavimo, glejte dokumentacijo na spleту.

Če želimo vstaviti v formulo besedilo, to naredimo s `\text{...}`:

$$\mathcal{P} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ je praštevilo}\}.$$

Če želimo vstaviti v formulo besedilo, to naredimo s `\text{...}`:

$$\mathcal{P} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ je praštevilo}\}.$$

Omenimo še okolje `cases`, s katerim obravnavamo primere:

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{če } x < 1, \\ x & \text{če } -1 \leq x \leq 1, \\ 1 & \text{če } 1 < x. \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{če je } x < 1, \\ 1 & \text{sicer} \end{cases}$$

---

Avtor se zahvaljuje Republiki Sloveniji za vsakdanji kruh.

## 2. MAKROJI

V  $\text{\LaTeX}$ u lahko definiramo svoje ukaze, ki jim pravimo tudi *makroji*. Tu predstavimo osnovno uporabo. Ukaz definiramo z

```
\newcommand{\imeUkaza}[n]{...}
```

pri čemer je  $n$  število argumentov, ki jih sprejme ukaz. Na argumente se sklicujemo z  $\#1, \#2, \dots, \#n$ . Ukaz brez argumentov definiramo z

```
\newcommand{\imeUkaza}{...}
```

Ali je res, da za vsak  $n \in \mathbb{N}$  in  $a \in \mathbb{R}$  obstaja natanko en  $b \in \mathbb{R}$ , da je  $b^n = a$ ?

Urejeni par:  $(x, y)$  ali  $\langle x, y \rangle$  in  $\langle x, y \rangle$ .

Ali se urejeni pari pišejo  $(x, y)$  ali  $\langle x, y \rangle$ ? Kdo bi vedel. Je pa tako, da se splača uporabiti makro, ker lahko kasneje še spremojamo njegovo definicijo.

Ne počnimo neumnosti z makroji: če seštejemo zaporedji  $a_1, \dots, a_n$  in  $b_1, \dots, b_n$ , dobimo zaporedje  $a + b_1, \dots, a + b_n$ .

Kaj pa dobimo, če napišemo  $x_1, \dots, x_{n+m}$ ?

## 3. OKLEPAJI

Poznamo več vrst oklepajev: ( in ), [ in ], { in }, < in >.

Še posebej opozorimo na < in >. Prav se piše  $\langle x, y \rangle$  in ne  $\langle x, y \rangle$ , ker  $\text{\LaTeX}$  obravnava simbola < in > kot relaciji ‘večje’ in ‘manjše’.

Včasih so oklepaji premahjni, denimo

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

V takih primerih pred uklepaj napišemo  $\backslash left$  in pred zaklepaj  $\backslash right$ :

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

Velikost oklepajev lahko nadzorujemo tudi ročno z ukazi  $\backslash big$ ,  $\backslash Big$ ,  $\backslash bigg$ ,  $\backslash Bigg$ :

$$\left(\left(\left(\left(\left.\right)\right)\right)\right)$$

## 4. PORAVNANE IN VEČVRSTIČNE ENAČBE

Paket *amsmath* vsebuje okolja za prikaz raznih enačb. Če uporabimo okolje brez zvezdice, na primer *equation*, dobimo oštreljeno enačbo, okolje z zvezdico, na primer *equation\**, pa nam da neoštreljeno enačbo. Vedno oštreljimo samo tiste enačbe, na katere se tudi sklicujemo.

To je ena formula

$$(1) \quad 1 < 2$$

4.1. Okolje *equation*. Običajne enačbe naredimo z okoljem *equation*,

$$x^2 + y^2 = 1$$

ali

$$(2) \quad x^2 + y^2 = 1$$

V enačbi (2) vidimo nekaj dolgočasnega.

**4.2. Okolje gather.** Z okoljem `gather` stavimo izraze enega pod drugega:

$$\begin{aligned}\log 2 &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots, \\ \frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} &\leq \sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}, \\ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} &= \frac{\pi^2}{6}.\end{aligned}$$

Narobe je

$$\begin{aligned}\log 2 &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \\ \frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} &\leq \sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2} \\ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} &= \frac{\pi^2}{6}.\end{aligned}$$

**4.3. Okolje multline.** Z okoljem `multline` zapišemo daljšo izpeljavo čez več vrstic. Prva vrstica je poravnana levo, zadnja desno in vsem vmesne sredinsko:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 &= \\ \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n y_i^2 + \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n y_i^2 - \sum_{i=1}^n x_i y_i \cdot \sum_{j=1}^n x_j y_j &= \\ \frac{1}{2} \cdot \sum_{i,j=1}^2 x_i^2 y_j^2 + \frac{1}{2} \cdot \sum_{i,j=1}^n x_j^2 y_i^2 - \sum_{i,j=1}^n x_i y_j x_j y_i &= \\ \sum_{i,j=1}^n \frac{1}{2} (x_i^2 y_j^2 + x_j^2 y_i^2 - 2x_i y_j x_j y_i) &= \sum_{i,j=1}^n \frac{1}{2} (x_i y_j - x_j y_i)^2 \geq 0.\end{aligned}$$

**4.4. Okolje align.** Z okoljem `align` lahko poravnamo vrstice na določen znaku. Mesto, kjer morajo biti vrstice poravnane, označimo z znakom `&`, prehod v novo vrsto označimo z `\backslash\backslash`:

$$\begin{aligned}(x+y)^2 - (x-y)^2 &= (x^2 + 2xy + y^2) - (x^2 - 2xy + y^2) \\ &= x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 2xy - y^2 \\ &= 2xy + 2xy \\ &= 4xy.\end{aligned}$$

Pozor: začetniki ga pogosto napačno postavijo tudi v zadnjo vrsto in potem dobijo dodatno prazno vrsto:

$$\begin{aligned}
 (x+y)^2 - (x-y)^2 &= (x^2 + 2xy + y^2) - (x^2 - 2xy + y^2) \\
 &= x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 2xy - y^2 \\
 &= 2xy + 2xy \\
 &= 4xy.
 \end{aligned}$$

Ali vidite, da je nekaj narobe? Z ukazom `\intertext` vstavimo vrstico besedila v izpeljavo, ne da bi pokvarili poravnnavo:

$$(x+y)^2 - (x-y)^2 = (x^2 + 2xy + y^2) - (x^2 - 2xy + y^2)$$

in zato

$$\begin{aligned}
 &= x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 2xy - y^2 \\
 &= 2xy + 2xy \\
 &= 4xy.
 \end{aligned}$$

Narobe je

$$(x+y)^2 - (x-y)^2 = (x^2 + 2xy + y^2) - (x^2 - 2xy + y^2)$$

in zato

$$\begin{aligned}
 &= x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 2xy - y^2 \\
 &= 2xy + 2xy \\
 &= 4xy,
 \end{aligned}$$

saj smo izgubili poravnnavo med obema deloma izpeljave.

Z okoljem align lahko poravnamo več stolpcov, ki jih ločimo z znakom &:

$$\begin{array}{ccc}
 3 + 5 = 8 & 2 + 2 = 4 & 1 + 1 = 2 \\
 3 + 7 = 10 & 4 + 1 = 5 & 2 + 3 = 5
 \end{array}$$

**4.5. Matrike.** Matriko naredimo z okoljem matrix:<sup>1</sup>

$$\begin{bmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \cdots & x_{1,n} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \cdots & x_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n,1} & x_{n,2} & \cdots & x_{n,n} \end{bmatrix}$$

Oklepaje postavimo okoli matrike z `\left` in `\right`, da so pravilne velikosti.

---

<sup>1</sup>Tu imamo izjemo, ko je pisanje ločila na koneč izraza nesmiselno.

## 5. IZREKI IN DOKAZI

**Izrek 5.1.** Vsaka zvezna funkcija na zaprtem intervalu doseže maksimum.

*Dokaz.* Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse aliquet arcu sit amet augue consequat efficitur. Nam non diam congue, porttitor nisl nec, faucibus ex. Fusce arcu ligula, molestie sit amet ligula sed, finibus sagittis felis. Nulla facilisi. Suspendisse potenti

$$f(x) = \int_0^x f'(t) dt,$$

donec ultrices malesuada bibendum. Quisque ac rutrum orci. Aliquam laoreet euismod nulla fermentum fringilla. Fusce bibendum dui enim, sed luctus diam lacinia sit amet. Fusce suscipit sodales vulputate. Suspendisse euismod ante est, ut fermentum mi consequat vitae. Sed vehicula, odio quis aliquam tincidunt, massa dolor tristique ligula, tempus egestas libero sem ac leo.  $\square$

**Posledica 5.2.** Parbola ima maksimum na zaprtem intervalu.

*Dokaz.* To sledi iz računa

$$\begin{aligned} (x+y)^2 - (x-y)^2 &= (x^2 + 2xy + y^2) - (x^2 - 2xy + y^2) \\ &= x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 2xy - y^2 \\ &= 2xy + 2xy \\ &= 4xy. \end{aligned}$$

$\square$


**Definicija 5.3.** Praštevilo je tako naravno število  $n$ , večje od 1, ki ni deljivo z nobenim naravnih številom.

**Vaja 5.4.** Na pamet izračunajte  $23 \times 117$ .

Tu se sklicujemo na izrek 5.1 in razdelek 6, ki je na strani 5.

## 6. DIAGRAMI

O diagramih ne bomo povedali več kot to, da uporabimo paket `xypic`. Primer diagrama:



## 7. CITATI IN REFERENCE

Z ukazom `\label{oznaka}` naredimo oznako razdelka, izreka ali enačbe. Na tako oznako se lahko sklicujemo z ukazi `ref`, `pageref` in `eqref`.

V razdelku 2 na strani 2 smo spoznali makroje. Izrek 5.1 ni preveč zanimiv, a ga profesorji radi sprašujejo na magistrskem izpitu, enačba (??) pa sploh nepomembna.

ANDREJ BAUER, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, JADRANSKA 19, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

*Email address:* Andrej.Bauer@andrej.com

BATMAN, BATMAN CAVE, UNDER WAYNE MANOR, GOTHAM CITY, USA

*Email address:* batman@gotham.com